Klinische Auswertungen: Urothelkarzinome

PD Dr. med. Sylke Zeißig

Ärztliche Leitung des Krebsregisters Rheinland-Pfalz

Urothelkarzinome

Lokalisation

Urothelkarzinome

Analysen

Eingeschlossen werden:

- ICD-10-GM Codes:
 - Nierenbecken (C65)
 - Ureter (C66)
 - Harnblase (C67, D09.0, D41.4)
 - Urethra (C68)
- Histologiecodes zu Urothelkarzinomen:
 - 8120/2 - Übergangszell-Carcinoma in situ
 - 8120/3 - Übergangszellkarzinom o.n.A.
 - 8130/2 - nichtinvasives papilläres Übergangszellkarzinom
 - 8130/3 - papilläres Übergangszellkarzinom

Urothelkarzinome

Analysen

- Meldezeitraum: 01.01.2016 – 01.11.2021
- Anzahl an Diagnosen
- Patientenströme
- Behandlungspfade
- Qualitätsindikatoren
- Covid-19 und Harnblasentumore

Anzahl an Diagnosen

ICD-10-GM	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Nierenbecken (C65)	75	73	62	79	57	346
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	1.224	1.196	1.087	1.121	993	5.621
Ureter (C66)	32	39	37	33	35	176
Urethra (C68)	15	14	9	8	6	52

Anzahl an Diagnosen

ICD-10-GM	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
Nierenbecken (C65)	75	73	62	79	57	346
Harnblase (C67, D09.0, D41.4)	1.224	1.196	1.087	1.121	993	5.621
Ureter (C66)	32	39	37	33	35	176
Urethra (C68)	15	14	9	8	6	52

Patientenströme

Urothelkarzinome der Harnblase

Patientenströme vom Wohnort
auf Kreisebene zur
behandelnden Klinik - Diagnose

Uroonkologisches Zentrum

Entfernung (in km)

Anzahl Patienten

Behandlungspfade für Urothelkarzinome der Harnblase

Qualitätsindikatoren

- S3-Leitlinie Urothelkarzinom (Version 1.1, 2016)
- **QI 4: Radikale Zystektomie innerhalb von 3 Monaten nach Diagnosestellung**
 - Zähler:
Patienten mit radikaler Zystektomie innerhalb von 3 Monaten nach Diagnosestellung
 - Nenner:
Alle Patienten mit Erstdiagnose eines Blasenkarzinoms $\geq$ pT2 und radikaler Zystektomie ohne neoadjuvante Chemotherapie

Qualitätsindikator

QI 4: Radikale Zystektomie innerhalb von 3 Monaten nach Diagnosestellung

COVID-19 und die Diagnosen von Urothelkarzinomen der Harnblase

Männer

COVID-19 und die Diagnosen von Urothelkarzinomen der Harnblase

Frauen

COVID-19 und die Therapie von Urothelkarzinomen der Harnblase

Männer

COVID-19 und die Therapie von Urothelkarzinomen der Harnblase

Frauen

Fazit

- Die Quantität und Qualität der Daten zu Urothelkarzinomen ist insgesamt bereits gut.
- Die Versorgung erfolgt häufig in den entsprechenden Uroonkologischen Zentren.
- Die radikale Zystektomie bei Tumoren $\geq$ T2 erfolgt gemäß Leitlinie im überwiegenden Teil der Fälle und zeigt die besten Ergebnisse im Hinblick auf die Überlebenschancen.
- Erste Auswertungen zu einem möglichen Einfluss von COVID-19 zeigen keinen Einfluss auf die gemeldeten UICC-Stadien und Therapien bei Urothelkarzinomen der Harnblase.

DATEN
AUSWERTEN

FORSCHUNG
UNTERSTÜTZEN

KREBS
BEKÄMPFEN

www.krebsregister-rlp.de